



# South Central Public Health District

Prevent. Promote. Protect.

1020 Washington Street N • Twin Falls, ID 83301

(208) 737-5900

## PROFILAXIS PARA EL ÁNTRAX

DEPENDIENDO DE SU EDAD, PESO, Y CONDICIONES MEDICAS  
PREEXISTENTES, SUS ANTIBIÓTICOS PUEDEN  
VARIAR DE ÉSOS ENUMERADOS ABAJO.

### Adultos:

- Ciprofloxacina: 500 mg píldoras dos veces al día por 60 días

### Tratamientos Alternativos:

- Amoxicilina: 500mg píldoras 3 veces al día por 60 días
- Doxyciclina: 100 mg píldoras 2 veces al día por 60 días

### Niños:

- Píldoras de Ciprofloxacina 2 veces al día por 60 días (la dosis exacta depende del peso del niño)

### Tratamiento Alternativo:

- Píldoras de Amoxicilina 3 veces al día por 60 días (la dosis exacta depende del peso del niño)

### Mujeres Embarazadas:

- Ciprofloxacina: 500 mg píldoras 2 veces al día por 60 días

### Tratamiento Alternativo:

- Amoxicilina: 500 mg píldoras 3 veces al día por 60 días

**USTED DEBE TOMAR TODA LA MEDICACIÓN DURANTE  
EL PERÍODO RECOMENDADO.**

**SI USTED EXPERIMENTA ALGUNA SÍNTOMA,  
PONGASE EN CONTACTO CON UN PROVEEDOR DEL CUIDADO MÉDICO  
INMEDIATAMENTE.**