



South Central Public Health District

Prevent. Promote. Protect.

1020 Washington Street N • Twin Falls, ID 83301
(208) 737-5900

PROFILAXIS PARA LA PLAGA

DEPENDIENDO DE SU EDAD, PESO Y CONDICIONES MEDICAS
PREEXISTENTES, SUS ANTIBIÓTICOS PUEDEN VARIAR
DE ÉSOS ENUMERADOS ABAJO.

Adultos:

- Doxycycline: 100mg píldoras dos veces al día por 7 días
O
- Ciprofloxacin: 500mg píldoras dos veces al día por 7 días

Tratamiento Alternativo:

- Chloramphenicol: 25mg píldoras 4 veces al día por 7 días

Niños:

- Doxycycline píldoras dos veces al día por 7 días (la dosis exacta depende del peso del niño)
O
- Ciprofloxacin: 20mg píldoras dos veces al día por 7 días

Tratamiento Alternativo:

- Chloramphenicol: 25mg tabletas 4 veces al día por 7 días

Mujeres Embarazadas:

- Doxycycline: 100mg píldoras dos veces al día por 7 días
O
- Ciprofloxacin: 500mg píldoras dos veces al día por 7 días

Tratamiento Alternativo:

- Chloramphenicol: 25mg píldoras 4 veces al día por 7 días

**USTED DEBE TOMAR TODA LA MEDICACIÓN DURANTE
EL PERÍODO RECOMENDADO.**

**SI USTED EXPERIMENTA ALGUNA SÍNTOMA,
PONGASE EN CONTACTO CON UN PROVEEDOR DEL CUIDADO MÉDICO
INMEDIATAMENTE.**