

URETRITIS DE NONGONOCOCCAL

La uretritis de Nongonococcal o la uretritis sin especificación ocurre en los órganos sexuales masculinos. Es una infección en la uretra (el pasaje que lleva la orina de la vejiga). La infección puede ser causada por varias bacterias diferentes, pero la mayoría de los casos son causados por el mismo que causa chlamydia.

Cómo puedo saber si tengo N.G.U./N.S.U.?

Muchos hombres no demostrarán muestras de N.G.U./N.S.U. Las mujeres compañeras de los hombres con N.G.U./N.S.U. pueden conseguir vaginitis sin especificación. Las mujeres encontrarán que tienen una descarga con un olor inusual de su vagina o ardor al orinar. Las mujeres pueden también tener dolor abdominal, sangramiento entre las reglas, o una fiebre mínima. Los hombres tendrán una descarga del pene y/o ardor al orinar, junto con ardor o comezón alrededor de la abertura del pene. Estas señales ocurren más por la mañana.

Qué hago si pienso que tengo N.G.U./N.S.U.?

Vaya inmediatamente a su oficina local de la salud del distrito o a su proveedor local del cuidado médico. Un examen y un prueba de laboratorio serán hechos. Si piensan usted tiene N.G.U./N.S.U., le darán una prescripción para medicina, un antibiótico. Es importante seguir cuidadosamente las instrucciones para tomar la medicina. Tome **toda** la medicina hasta que se la termine, incluso si ya no tiene síntomas, y **no comparte su medicina** con cualquier persona. Si la medicina le causa cualquier problema llame a la clínica inmediatamente.

Es N.G.U./N.S.U. serio?

Sin tratamientos daños permanentes a los órganos sexuales de ambos hombres y mujeres pueden ocurrir, haciendo el poder de tener niños difícil o imposible. Las mujeres pueden contraer una infección dolorosa llamada Enfermedad Inflamatoria Pelvica, o PID, por la vaginitis sin especificación. Si el PID no se trata con el tiempo, tejido fino de cicatriz se formara y bloquea los tubos de falopio que hace el poder de embarazarse o tener niños difícil si no imposible para las mujeres o puede ocasionar un embarazo tubal cual requeriría cirugía y que puede causar la muerte para la mujer embarazada y el feto (bebé por nacer).

Qué información debo saber sobre mi compañero(s) sexual?

Su compañero sexual del momento debe tener un examen, ser examinado y tomar el medicamento al mismo tiempo que usted para estar seguros que se haigan curado de la infección. No tenga relaciones sexuales hasta que usted y su compañero(s) sexual estén seguros que están libres del N.G.U./N.S.U. y del vaginitis sin específico. Cualquier persona con quien usted haiga tenido relaciones sexuales en los pasados meses deben también ser avisados, examinados y tratados. En la oficina local de la salud del distrito están dispuestos a ayudarle a ponerse en contacto con su compañero(s).

Cómo puedo evitar de conseguir N.G.U./N.S.U.?

- Tenga relaciones sexuales solamente con una persona que no este infectado y que tenga relaciones sexuales solamente con usted.
- Utilice los condones del látex correctamente cada vez que usted tenga cualquier contacto sexual.
- Decida no tener relaciones sexuales— es la única manera de estar 100% segura de evitar N.G.U./N.S.U. y otras enfermedades transmitidas sexualmente.
- Cuando usted utiliza drogas y el alcohol es difícil tomar buenas decisiones sobre su actividad sexual –Tenga cuidado!
- Recuerde: Cualquier persona que es activa sexualmente puede contraer una enfermedad transmitida sexualmente – incluyendo el VIH!

Dónde puedo aprender más sobre N.G.U./N.S.U.?

Llame a la oficina de su proveedor personal del cuidado medico o a la oficina local de la salud del distrito. Para referencias y información adicional pongase en contacto con el Teléfono Directo Nacional del STD al (800) 227-8922 o para referencias y información locales en Idaho llame al Idaho CareLine al (800) 926-2588.

