

1. Abrupción Placentaria

Ésta condición es cuando la placenta se separa del sitio de implantación uterina antes o mientras da a luz resultando en un parto inmediato, usualmente por cesárea. La placenta de una fumadora es más fina, haciéndola más susceptible a una abrupción.

2. Placenta Previa

De nuevo, ya que la placenta de una fumadora es delgada, es más probable que cubra la boca del útero (el cérvix). Esto puede causar sangrado durante el embarazo. Una cesárea puede ser necesaria debido al riesgo de que la mamá o bebe tengan una hemorragia.

3. Síndrome de Muerte Súbita Infantil (SIDS—por sus siglas en inglés)

Los bebés que nacen a madres que fuman tienen posibilidad más alta de morir de SIDS.

4. Parto Prematuro

Si usted fuma, su cuerpo es más probable de tratar de terminar su embarazo antes de tiempo por causarle que tenga un parto prematuro en un esfuerzo de proteger a su bebé por los efectos secundarios dañinos del hábito de fumar.

5. Muerte Fetal

El fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de que su bebé muera durante el embarazo

6. Bajo Peso al Nacer

El peso de nacimiento es un factor importante en la salud de su bebé. Entre más pequeño sea el bebé, hay más riesgo para muchos problemas. De hecho, el bajo peso al nacer es una de las razones principales por las cuales los bebés se enferman y mueren en los primeros meses de vida.

7. Cólico

Estudios recientes muestran que si usted fuma su bebe es más probable de tener cólico.

8. Infecciones Respiratorias

Si usted fuma durante el embarazo o si su bebé está rodeado por humo de segunda mano, su bebé es más probable de estar enfermo y tener asma u otros problemas respiratorios.

9. Ruptura Prematura de Membranas (PROM—por sus siglas en inglés)

Otro riesgo creado por el fumar durante el embarazo es que la bolsa de agua se rompe demasiado temprano. También puede causar un nacimiento prematuro.

10. Aborto Involuntario

Si usted fuma, puede tener problemas en el retener su embarazo. También puede reducir su fertilidad.